

Подготовка к колоноскопии

Режим **единовременного** применения



Подготовка описана с учетом выполнения наркоза



Последний прием пищи накануне дня исследования в 14.00



В течение 3-5 дней до исследования необходимо **соблюдение диеты** (см. Клинические рекомендации РЭНДО приведенные далее)



В день исследования не пить, не есть!

Исключение: прием гипотензивных и антиаритмических препаратов разрешен с несколькими глотками воды в конце подготовки.

После 6.00 не пить !



Телефон эндоскопического отделения: (812) 292-29- 61
www.spbkbran.ru

Фортранс

Если колоноскопия назначена **на первую половину дня, до 12.00**

Режим **единовременного** применения, накануне исследования:

18.00 - 19.00

Содержимое 1 пакета Фортранса растворить в 1 литре питьевой негазированной воды комнатной температуры, выпить в течение часа по 1 стакану в 15 минут



19.00 - 20.00

Содержимое 1 пакета Фортранса растворить в 1 литре питьевой негазированной воды комнатной температуры, выпить в течение часа по 1 стакану в 15 минут



20.00 - 21.00

Содержимое 1 пакета Фортранса растворить в 1 литре питьевой негазированной воды комнатной температуры, выпить в течение часа по 1 стакану в 15 минут



21.00 - 22.00

Содержимое 1 пакета Фортранса растворить в 1 литре питьевой негазированной воды комнатной температуры, выпить в течение часа по 1 стакану в 15 минут



Необходимо выпить все 4 литра.
Подготовку можно дополнить любым объемом воды или прозрачной жидкости (например, чай)

Подготовка к колоноскопии

Режим **двухэтапного** применения

Фортранс

Если колоноскопия назначена **на вторую половину дня, после 12.00**

Режим **двухэтапного** применения, накануне исследования:

●
Подготовка описана с учетом выполнения наркоза

●
Последний прием пищи накануне дня исследования в 14.00

●
В течение 3-5 дней до исследования необходимо **соблюдение диеты** (см. Клинические рекомендации РЭНДО приведенные далее)



В день исследования не пить, не есть!

Исключение: прием гипотензивных и антиаритмических препаратов разрешен с несколькими глотками воды в конце подготовки. **После 7.00 не пить !**



Телефон эндоскопического отделения: (812) 292-29- 61
www.spbkbran.ru

18.00 - 19.00

Содержимое 1 пакета Фортранса растворить в 1 литре питьевой негазированной воды комнатной температуры, выпить в течение часа по 1 стакану в 15 минут



19.00 - 20.00

Содержимое 1 пакета Фортранса растворить в 1 литре питьевой негазированной воды комнатной температуры, выпить в течение часа по 1 стакану в 15 минут



Утром, в день процедуры или операции:

05.00 - 06.00

Содержимое 1 пакета Фортранса растворить в 1 литре питьевой негазированной воды комнатной температуры, выпить в течение часа по 1 стакану в 15 минут



06.00 - 07.00

Содержимое 1 пакета Фортранса растворить в 1 литре питьевой негазированной воды комнатной температуры, выпить в течение часа по 1 стакану в 15 минут



Необходимо выпить все 4 литра. Подготовку можно дополнить любым объемом воды или прозрачной жидкости (например, чай)