

Подготовка к колоноскопии

Режим единовременного применения



Подготовка описана с учетом выполнения наркоза



Последний прием пищи накануне дня исследования в 14.00



В течение 3-5 дней до исследования необходимо соблюдение диеты (см. Клинические рекомендации РЭНДО приведенные далее)



В день исследования не пить, не есть!

Исключение: прием гипотензивных и антиаритмических препаратов разрешен в конце подготовки.

После 6.00 не пить !



Телефон эндоскопического отделения: (812) 292-29- 61

www.spbkbran.ru

Эзиклен

Если колоноскопия назначена на первую половину дня, до 12.00

Режим единовременного применения, накануне исследования:

18.00 - 19.00

Содержимое одного флакона препарата «Эзиклен» вылить в прилагаемый мерный стакан и развести водой до метки 0,5 л.

Выпить в течение одного часа частями, не одновременно!



19.00 - 20.00

выпить литр прозрачной жидкости (вода, чай) (два мерных стакана)



20.00 - 21.00

Содержимое второго флакона препарата «Эзиклен» вылить в прилагаемый мерный стакан и развести водой до метки 0,5 л.

Выпить в течение одного часа частями, не одновременно!



21.00 - 22.00

выпить литр прозрачной жидкости (вода, чай) (два мерных стакана)



Подготовка к колоноскопии

Режим двухэтапного применения



Подготовка описана с учетом выполнения наркоза



Последний прием пищи накануне дня исследования в 14.00



В течение 3-5 дней до исследования необходимо соблюдение диеты (см. Клинические рекомендации РЭНДО приведенные далее)



В день исследования не пить, не есть!

Исключение: прием гипотензивных и антиаритмических препаратов разрешен в конце подготовки.

После 7.00 не пить !



Телефон эндоскопического отделения: (812) 292-29- 61

www.spbkran.ru

Эзиклен

Если колоноскопия назначена на вторую половину дня, после 12.00

Режим двухэтапного применения, накануне исследования:

19.00 - 20.00

Содержимое одного флакона препарата «Эзиклен» вылить в прилагаемый мерный стакан и развести водой до метки 0,5 л.

Выпить в течение одного часа частями, не одномоментно!



20.00 - 21.00

выпить литр прозрачной жидкости (вода, чай) (два мерных стакана)



Утром, в день процедуры или операции:

05.00 - 06.00

Содержимое второго флакона препарата «Эзиклен» вылить в прилагаемый мерный стакан и развести водой до метки 0,5 л.

Выпить в течение одного часа частями, не одномоментно!



06.00 - 07.00

выпить литр прозрачной жидкости (вода, чай) (два мерных стакана)

